Ergebnisse der Getreideernte 2026

Luisa Köhler und Dr. Wolfram Richardt

Für die Getreideernte 2026 wurden unterdurchschnittliche Erträge im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnet. Das trockene Frühjahr sowie die Rekord-Temperaturen um die 40 °C-Marke Ende Juni in der Zeit der Kornfüllungsphase führten vielerorts zur frühzeitigen stressbedingten Abreife der Getreidepflanzen. Die durchschnittlichen Inhaltsstoffe der Getreide im Erntejahr 2026 sind in Tab. 1 gezeigt:

Tab. 1: Ergebnisse der Getreideernte 2026

Parameter	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer
Trockensubstanz [g\kg]	871	871	858	869	872
Rohasche [g/kg TS]	15	21	17	16	30
Rohprotein [g/kg TS]	129	112	97	111	113
Rohfaser [g/kg TS]	24	54	25	24	125
Rohfett [g/kg TS]	15	20	10	13	31
Stärke [g/kg TS]	707	614	647	707	454
Zucker [g/kg TS]	33	28	55	41	15
$aNDF_{om}$ [g/kg TS]	114	181	140	116	326
ADF_{om} [g/kg TS]	31	67	31	29	153
ME Geflügel [MJ/kg TS]	14,8	13,0	13,4	14,5	10,6
ME Schwein [MJ/kg TS]	15,6	15,3	15,2	15,5	14,9
ME Rind [MJ/kg TS]	13,4	13,2	13,4	13,4	12,6
NEL Rind [MJ/kg TS]	8,6	8,4	8,6	8,6	7,9
GE (GfE_2023) [MJ/kg TS]	18,3	18,4	18,0	18,2	18,7
OMD_{FAN1} [%]	87	87	90	89	74
ME (GfE_2023) [MJ/kg TS]	13,0	13,1	13,4	13,2	11,1

Trockensubstanz-Gehalt

Der Trockensubstanzgehalt der eingeschickten Getreideproben lag durchschnittlich bei 87 % mit einer Spannweite von 72-94 %. Dabei tritt kein grundlegender Unterschied zwischen den Getreidearten sowie zum Vorjahr auf. Die Anteile an Proben mit einem TS-Gehalt < 860g/kg, welche feucht gedroschen wurden, liegen für alle Getreidearten unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das spiegelt die guten Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt der Ernte in diesem Jahr wider, wohingegen die Ernte 2025 aufgrund der vielen Niederschläge im Juli nicht optimal

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:
https://www.lkvsachsen.de/footernavi/datenschutzerklaerung/

verlief. Für Getreide mit einem Trockensubstanzgehalt < 860 g/kg besteht ohne Nachtrocknung eine erhebliche Gefahr für mikrobiologischen Verderb.

Tab. 2: Trockensubstanzgehalte [g/kg]

Probenart	**Trockensubstanz [g/kg]**			**Anteil Proben < 860g/kg**
	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$	
Weizen	871	815	927	18,4
Gerste	871	801	935	18,3
Roggen	858	797	891	49,6
Triticale	869	829	897	23,4
Hafer	872	834	926	22,4

Rohprotein-Gehalt

Die durchschnittlichen Rohproteingehalte aller Getreideproben liegen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr mit einer geringen Tendenz nach oben. Weizen hat im Jahr 2026 einen durchschnittlichen Rohproteingehalt von 12,9 % TS. Der Wert liegt somit geringfügig um 0,1 % TS über dem Ergebnis des Vorjahres. Der Rohproteingehalt von Gerste ist im Vergleich zu Vorjahr um 0,4 % TS gestiegen und liegt bei 11,2 % TS. Roggen und Hafer zeigen im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 % TS gestiegene Rohproteingehalte. Für Triticale ergab sich ein um 0,1 % TS geringerer Rohproteingehalt als im Erntejahr 2025. Insgesamt liegen die Rohproteingehalte trotzdem ähnlich wie in den letzten Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau. Dies ist bei der Rationsberechnung zu berücksichtigen, da viele Tabellenwerke und Datenbanken von höheren Rohproteingehalten ausgehen.

Tab. 3: Rohproteingehalte [g/kg TS]

Probenart	**Rohprotein [g/kg TS]**			**Anteil Proben <100g/kg TS**
	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$	
Weizen	129	79	186	4,3
Gerste	112	56	168	18,3
Roggen	97	69	148	67,9
Triticale	111	81	153	23,9
Hafer	113	86	140	19,4

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:
https://www.lkvsachsen.de/footernavi/datenschutzerklaerung/

Stärke- und Zucker-Gehalt

Die Stärke- und Zuckergehalte aller Getreidearten liegen weitestgehend auf dem Niveau des Vorjahres. Einzige Ausnahme stellt der Stärkegehalt von Weizen dar, da dieser im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 55 g/kg TS gestiegen ist. Somit liegt der Stärkegehalt der Weizenproben jedoch wieder auf dem Niveau des Erntejahres 2024 mit 714 g/kg TS. Im Getreidekorn wurde quantitativ mehr Stärke als Protein gebildet.

Tab. 4: Stärke- und Zuckergehalt [g/kg TS]

Probenart	**Stärke [g/kg TS]**			**Zucker [g/kg TS]**		
	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$
Weizen	707	645	760	33	20	43
Gerste	614	546	682	28	15	41
Roggen	647	568	684	55	37	65
Triticale	707	650	745	41	29	53
Hafer	454	223	664	15	8	43

Rohfaser- und ADF_{om}, $aNDF_{om}$-Gehalte

Sowohl die Rohfaser- als auch die ADF_{om}- und $aNDF_{om}$-Gehalte liegen im Bereich der Ergebnisse des Vorjahres, es zeigte sich lediglich ein geringfügiger Abfall der Faserkennzahlen über alle Getreidearten hinweg. Am Beispiel von Hafer entspricht dies 5 g/kg TS für Rohfaser, 22 g/kg TS für ADFom und 37 g/kg TS für aNDFom. Auffällig sind bei Hafer vor allem die, im Gegensatz zu den anderen Getreidearten, vergleichsweise hohen Rohfaser-, ADF_{om} und $aNDF_{om}$-Gehalte. Sollte Hafer in Rationen eingesetzt werden, ist dies unbedingt zu berücksichtigen.

Tab. 5: Rohfasergehalt [g/kg TS]

Probenart	**Rohfaser [g/kg TS]**		
	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$
Weizen	24	15	36
Gerste	54	34	75
Roggen	25	19	34
Triticale	24	17	34
Hafer	125	25	214

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:
https://www.lkvsachsen.de/footernavi/datenschutzerklaerung/

Tab. 6: ADF_{om} und $aNDF_{om}$-Gehalte

Probenart	ADF_{om} [g/kg TS]			$aNDF_{om}$ [g/kg TS]		
	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$
Weizen	31	16	47	114	85	144
Gerste	67	38	97	181	119	243
Roggen	31	22	47	140	119	157
Triticale	29	19	44	116	99	141
Hafer	153	36	253	326	136	532

Energiegehalt Wiederkäuer

Tab. 7: Umsetzbare Energie (ME) und Netto-Energie (NEL) [MJ/kg TS]

Probenart	ME [MJ/kg TS]			NEL [MJ/kg TS]		
	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$
Weizen	13,4	13,3	13,6	8,6	8,5	8,7
Gerste	13,2	12,9	13,4	8,4	8,2	8,5
Roggen	13,4	13,3	13,5	8,6	8,5	8,6
Triticale	13,4	13,3	13,5	8,6	8,5	8,7
Hafer	12,6	11,6	13,3	7,9	7,1	8,5

Probenart	ME (GfE, 2023) [g/kg TM]		
	Mittelwert	$Min_{0,997}$	$Max_{0,997}$
Weizen	13,0	12,8	13,1
Gerste	13,1	12,9	13,3
Roggen	13,4	13,2	13,6
Triticale	13,2	13,1	13,4
Hafer	11,1	10,7	11,4

Die Energiegehalte für Wiederkäuer entsprechen den Ergebnissen der Vorjahre. Es zeichnen sich leicht gestiegene Energiegehalte für Weizen, Gerste, Triticale und Hafer ab. Insgesamt konnten trotz der Rekordtemperaturen in der Zeit der Kornfüllungsphase gute Ergebnisse bei der Getreideernte 2026 erreicht werden.

Stand: November 2026

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:
https://www.lkvsachsen.de/footernavi/datenschutzerklaerung/